

## **Rutin vid magsjuka, diarré och eller kräkning**

Dessa sjukdomsrelaterade reagens kräver insatser av olika slag för att minimera smittorisken för skolans elever och personal. Småskolan följer Socialstyrelsens rekommendation vilket bland annat innebär att den person som drabbats av dylika reagens ska ha varit symptomfri i 48 timmar innan återgång till skolverksamheten är aktuell.

Socialstyrelsen skriver vidare att smittade och sjuka barn och vuxna inte ska delta i skoleverksamheten när de har akuta mag-tarmsymtom i form av kräkningar och vattentunn diarré. Barnet kan återgå till skolverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under 48 timmar. Samråd bör ske med skolan.

Om barnet har varit utomlands och fortfarande har lös avföring när det förväntas återgå till barnomsorgen, ska man först kontakta sjukvården för att utesluta allmänfarlig sjukdom (t.ex. salmonella) som orsak till diarrén.

På Småskolan ber vi också föräldrar att vara noga med att berätta för oss om någon av dessa reagens varit aktuella.

### *För föräldern:*

- Vi magsjuka, diarré och/eller kräkning ska barnet hållas hemma 2 dygn efter det att de ätit normalt, inte kräkts eller haft diarré.

### *För personal, vid magsjuka, diarré och/eller kräkning hos någon av eleverna:*

- Iaktta extra försiktighet och genomför handtvättning med alla elever extra noga.
- Vid kräkning - var noga med att täcka med engångsprodukter (papper) för att minimera risken för luftburen smitta.
- Om möjligt; Stäng aktuell lokal för elever/annan personal och genomför så snart som möjligt sanering. Använd om möjligt skyddsförkläde och skyddshandskar. Ytdesinfecera området.
- Var extra nog med den personaliga handhygien. Använd handsprit enligt uppsatta instruktioner.

Datum som ovan

Fredrik Pålsson  
Rektor

---

-